

Audit 2024

Kontakt:

Tumorzentrum Hirslanden Zürich

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

T +41 44 387 96 62

tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

offene Studien

Mammakarzinom

Studiename

Ascent-03 Studie

Ascent-04 Studie

EKIB Studie

EXPERT- Studie (ANZ 1601/ BIG 16-02)

HER2CLIMB-05 (Seagen)

LidERA-Studie (Roche G042784)

Mallorca-Studie

POLAR-Studie (IBCSG 59/19)

PROMs

SASCIA-Studie (Gilead)

SERENA 4-Studie (Astra Zeneca)

TAXIS-Studie (SAKK 23/16)

Zielgruppe/ Kurzbeschreibung

Sacituzumab Govitecan ("Antibody Drug Conjugate") Standard Chemotherapie bei PD-L1-negativem oder mit anti-PD-L1 Agent vorbehandeltem PD-L1-positivem metastasiertem Triple negativem Brustkrebs.

Sacituzumab Govitecan ("Antibody Drug Conjugate") / Pembrolizumab vs. Standard Chemotherapie/Pembrolizumab bei PD-L1-positivem metastasiertem Triple negativem Brustkrebs.

Analyse der Heterogenität von Mammakarzinomen und Infiltraten von Immunzellen mittel Massenzytometrie und der Relevanz für den Patienten.

Adjuvante Radiotherapie versus Beobachtung bei brusterhaltender und endokriner Therapie von PatientInnen mit molekular bestimmten Luminal A-Mammakarzinom.

Tucatinib oder Placebo in Kombination mit Trastuzumab und Pertuzumab als Erhaltungstherapie bei metastatischem HER2+ Brustkrebs.

Adjuvante endokrine Therapie mit Giredestrant (oral SERD) vs. endokrine Therapie der Wahl für 5 Jahre bei HR+, HER2- PatientInnen mit EBC.

Die Bedeutung der präoperativen Markertechnik für eine effiziente und sichere gezielte Axilladissektion bei Patientinnen mit Brustkrebs (Hydromark-Clip versus Pintuition seed).

Palbociclib bei HR-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv.

Patient reported outcomes bei Patientinnen mit onkoplastischer Rekonstruktion bei brusterhaltender Operation.

Phase III postneoadjuvante Studie zur Beurteilung von Sacituzumab Govitecan bei primärem HER2-negativem Brustkrebs mit erhöhtem Rezidivrisiko (inkomplette path. Remission) nach Standard neoadjuvanter Chemotherapie.

Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zu AZD9833 plus Palbociclib im Vergleich zu Anastrozol plus Palbociclib bei Patientinnen mit Östrogenrezeptor-positivem HER2-negativem Mammakarzinom, die bisher keine systemische Behandlung der fortgeschrittenen Erkrankung erhalten haben (SERENA-4).

Gezielte versus radikale axilläre Lymphknotenoperation gefolgt von Radiotherapie bei Patientinnen mit axillären Lymphknotenmetastase(n).

	VISION-Studie (SAKK 23/18)	Vakuum-assistierte Biopsie vor Tumoroperation als intra- oder präoperativer Ersatz für Patienten mit Brustkrebs bei nach einer neoadjuvanten Chemotherapie mittels MRT kein oder fast kein Tumorgewebe mehr nachweisbar ist (VISION I).
Urogenitale Tumore	PCO Studie (Prostate Cancer Outcome)	Messung der Lebensqualität von Patienten mit Prostatakarzinom mit einem weltweit einheitlichen Patientenfragebogen.
	Ironman Studie	
	MRI Blasenkrebs-Studie	Internationales Register für Männer mit fortgeschrittenem Prostatakrebs, welches Informationen die Art des Krebses, die Behandlung und Nebenwirkungen der Behandlungen sammelt.
	SAKK 06/ 19	Multiparametrische MRI Studie zur Verbesserung der Stadieneinteilung und Entscheidungsfindung zur Behandlung bei Blasenkrebs. Multizentrische, singel-arm Phase II Studie: Perioperative Behandlung mit BCG / Postoperative Immuntherapie in Kombination mit Standardchemotherapie bei Patienten mit operablem Karzinom des Harntrakts.
Gastrointestinale Tumore	EDIUM Studie	Patient-reported outcome study Darmkrebs Patienten: Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Massnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung
	ESODATA Studie	International standardisierte online Datenbank (PROMs) für Patienten mit benignen und malignen Speiseröhrenerkrankungen.
	IBDS-CRC Studie	Image-based ex vivo drug screening und Genomik/Transkriptomik für Patienten mit colorectal cancer stage II, III or IV
	Patient-derived organoid generation Study	PDOs (Patient-derived organoid) bei Pankreaskrebs: eine offene, single-centre, einarmige, offene Machbarkeitsstudie.
	PREFER-Studie	Prospektive endoskopische Nachsorge von Patienten mit T1bN0M0 ösophagealem Adenokarzinom.
	Qualitätssicherungstudie Duodenaltumore	Qualitätssicherung der perioperativen Morbidität und des postoperativen Follow up nach Eingriffen im hepato-duodeno-pankreatischen Gebiet.
	Qualitätssicherungstudie Pankreaskarzinom	Qualitätssicherung der perioperativen Morbidität und des postoperativen Follow up nach Pankreasresektionen.
	ROBOT-2 Studie	Roboterassistierte Ösophagektomie im Vergleich zur konventionellen thorakoskopischen Ösophagektomie (RAE vs CTE) bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom des Ösophagus.
	Tiger Studie	Verteilung von Lymphknotenmetastasen beim Ösophaguskarzinom (TIGER).
Hämatologische Tumore	Abbie Valor-Studie	Studie für Patienten mit neu diagnostizierter AML, welche 1st line mit Venetroclax behandelt werden.
	EBMT-Register	Register für Patienten welche eine Blutstammzelltransplantation oder eine andere Zelltherapie (z.B. CAR-T-Zelltherapie)
	SAKK EMCL-Registry	Europäisches Mantelzellymphom-Register: statistische Erhebung von Diagnose, Therapie- und Therapieansprechen und Krankheitsverlauf und Rezidiv-Auftreten.

Neuroonkologische Tumore

Gliostar Studie

Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit des Antikörper-Cytokin-Fusionsproteins L19TNF in Kombination mit Lomustin bei Patienten mit Glioblastom im ersten Rezidiv

Meningiom-Studie

Bevölkerungsstudie zum Auftreten, Überleben und den molekularen Charakteristika bei Meningiomen im Kanton Zürich, Schweiz.

PERGOLA-Studie

Pembrolizumab für neu diagnostiziertes Glioblastom: eine prospektive, offene, einarmige, multizentrische Phase-II Studie.

Organübergreifende Studien

AGE-1 Studie

Evaluation von forensischen Methoden zur Altersschätzung bei krebserkrankten und Kontroll-Personen.

Roche GLYCART Studie

Ex vivo Model von frischem Tumorgewebe.
